

Vorbereiding met Moviprep

U heeft een afspraak voor onderzoek op :

.....dag, dd.....om uur

Twee dagen voor het onderzoek:dagavond

- 22.00 uur 2 Dulcolax (Bisacodyl) dragees innemen.

Eén dag vóór het onderzoek:dag

- normaal ontbijt;
- tussen 12.00-14.00 uur 1 liter Moviprep + een ½ liter heldere vloeistof;
- tussen 19.00-21.00 uur 1 liter Moviprep + een ½ liter heldere vloeistof;
- na 00.00 uur mag u niet meer eten of drinken.

Zoals aangegeven in bovenstaand schema wordt het sterk aangeraden om bij elke liter Moviprep **minstens een halve liter** (= 2 glazen) helder vloeistof te drinken bv. water, heldere soep, vruchtensap zonder pulp, frisdranken, thee en/of koffie zonder melk.

Let op:

- U mag niet meer eten vanaf het moment dat u start met Moviprep.
- Op de dag van het onderzoek mag u niet meer eten of roken.
- Er moet minstens 1 uur zitten tussen het einde van de opname van de vloeistof (Moviprep of heldere vloeistof) en het begin van het onderzoek.

Vragen?

Vanzelfsprekend kunt u met eventuele andere vragen op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag-, darm-, en lever (MDL),
☎ (036) 868 86 16.