

Verwijderen van een mediane halscyste bij kinderen

Bij uw kind is een mediane halscyste geconstateerd. Dit is een aangeboren cyste (= een met vocht gevuld blaasje) in het middelste deel van de hals. Er is met u besloten de cyste te verwijderen.

Voor de operatie

- De behandeling wordt onder narcose verricht. In verband met deze narcose zal een preoperatief onderzoek (voorbereidend onderzoek voorafgaand aan de operatie)plaats vinden.
- Vanaf 2 weken voor de operatie mag uw kind geen bloedverdunnende pijnstillers of bloedverdunders gebruiken, zoals Aspirine, Acetosal, A.P.C., Ascal, Aspro-bruis, Ibuprofen, Naprosyne, Voltaren, etc.). Als een pijnstiller nodig is geef dan een Paracetamol tablet.
- Uw kind is nuchter volgens de afspraak die u van de afdeling opname heeft ontvangen.
- U mag thuis alvast de temperatuur van uw kind meten. Als uw kind een temperatuur heeft van boven de 38° C of ziek is dan vragen wij u dit 's morgens om 7 uur telefonisch te melden aan de afdeling kinderdagbehandeling ☎ **(036) 868 87 98**.
- Als uw kind twee weken voor de behandeling in contact is geweest met een kinderziekte(bijvoorbeeld kinkhoest, roodvonk of waterpokken) en deze ziekte niet heeft gehad dan moet de behandeling uitgesteld worden. U kunt een nieuwe afspraak maken als uw kind beter is.
- Het is verstandig om eventuele inentingen tot 2 weken na de behandeling uit te stellen.
- Wilt u een pyjama en ponsplaatje meenemen?

Duur van de opname

De opname duur van deze behandeling is 2-3 dagen.

- 1e dag: opname en operatie
- 2e dag of 3e dag: ontslag

De operatie

Via een snee in de huid op de hoogte van de zwelling wordt de cyste verwijderd. Ook wordt het middelste deel van het tongbeen verwijderd omdat de cyste vaak hierdoor heen loopt. Het verwijderde weefsel wordt meestal onderzocht op afwijkingen. De uitslag krijgt u na enkele weken van de KNO-arts.

Na de operatie

- Als uw kind wakker wordt heeft hij/zij een wond die horizontaal in de hals loopt. Er komt een slangetje uit het wondgebied (drain) waar een fles (drainpot) aan vast zit. Overtollig wondvocht loopt hierdoor af.
- Meestal valt de pijn mee. Een Paracetamol tablet als pijnstillert is meestal voldoende.
- Slikken kan soms wat gevoelig zijn de eerste dag na de operatie.
- Uw kind mag alles eten en drinken.
- Uw kind mag uit bed komen, de eerste keren met begeleiding.
- Soms wordt een antibioticum voorgeschreven.
- De 2e of 3e dag kan de drain meestal worden verwijderd en hierna mag uw kind naar huis. De drain wordt verwijderd als er de laatste 24 uur vrijwel geen vocht meer in de fles is bij gekomen. Het slangetje van de drain is vastgehecht in de huid. De hechting wordt doorgeknipt en het slangetje kan dan uit de wond worden verwijderd. Dit is over het algemeen niet pijnlijk.
- Na een week worden de hechtingen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Na ontslag uit het ziekenhuis

- Probeer de eerste week de wond droog te houden bij het douchen.
- Als uw kind pijn heeft kunt u uw kind een tablet Paracetamol (maximaal 4 keer per dag 500 mg) geven.

U moet contact opnemen met de polikliniek KNO of buiten kantooruren met de Spoedpost van het Flevoziekenhuis als uw kind:

- koorts krijgt boven de 38 ½° C;
- de wond gezwollen, rood of warm is (kan een ontsteking zijn);
- toenemende ernstige pijnklachten heeft.

Complicaties

Er kan een nabloeding van de wond ontstaan, dit gebeurt meestal aansluitend of kort na de ingreep. Soms is het nodig om opnieuw onder narcose te gaan om de bloeding te vinden en het bloedende vaatje dicht te branden.

Resultaat

Na enkele weken is uw kind volledig hersteld. In uitzonderlijke gevallen kan de cyste weer terugkomen of een fistel(nattend wondje) ontstaan. Een aanvullende behandeling of operatie zal dan moeten plaatsvinden.

Tot slot

De polikliniek KNO is te bereiken op ☎ (036) 868 88 21 (ma t/m vrij van 09.00-17.00 uur). Buiten deze tijden kunt u voor spoedgevallen terecht op de Spoedpost, ☎ (036) 868 88 11.

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven. Het kan zijn, dat er voor u ondanks de uitleg van uw arts en het lezen van deze folder, nog vragen zijn. Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met uw KNO-arts.

De KNO-artsen van het Flevoziekenhuis