


Conisatie

In deze tekst leest u over de conisatie. Wat is een conisatie? Hoe verloopt een conisatie? Wat zijn de gevolgen van een conisatie? Hoe krijgt u de uitslag? Wanneer zijn de nacontroles?

Wat is een conisatie?

Conisatie is een operatie waarbij de gynaecoloog een stukje van de baarmoedermond verwijdert. Het weggesneden stukje heeft de vorm van een kegeltje. Dat wordt ook conus genoemd. De baarmoeder zelf blijft intact en het krijgen van kinderen blijft mogelijk. De operatie gebeurt onder narcose.



Waarom een conisatie?

Waarschijnlijk is alles begonnen met het vinden van een aantal afwijkende cellen in uw uitstrijkje. Er is vervolgens inwendig onderzoek met de colposcoop gedaan. Daaruit bleek dat er sprake is afwijkende cellen ook wel dysplasie genoemd. Deze afwijkende cellen kunnen op den duur (jaren) kwaadaardig worden. Om dit te voorkomen, nemen wij in uw geval het zieke slijmvlies liever weg. Andere behandelingsmethoden of een afwachtende houding lijken voor u minder geschikt.

Hoe verloopt een conisatie?

U komt voor een opname in het ziekenhuis in een periode dat u niet menstrueert. De operatie vindt onder algehele narcose plaats. Van de baarmoedermond wordt een kegelvormig stukje weggehaald. U krijgt geen litteken want u wordt via de vagina geopereerd. Na de conisatie kan de gynaecoloog soms een tampon in de schede plaatsen vanwege het bloedverlies. In dat geval hebt u meestal ook een katheter in de blaas. De tampon en de katheter worden na enkele uren weggehaald. Ook kan de gynaecoloog een extra bloedstollend middel in de schede brengen die u eventueel na enkele uren of dagen als een soort bruine prop uit de schede kunt verliezen.

Na een conisatie

Om de genezing goed te laten verlopen mag u tot vier weken na de ingreep geen geslachtsgemeenschap hebben. Ook is het gebruik van tampons ongewenst. Verder mag u niet zwemmen en in een bad zitten vanwege kans op een infectie. Thuis treed soms nog een paar dagen wat bloedverlies en bruinachtige afscheiding op. Als dit meer is dan bij een gewone menstruatie, neemt u dan contact met ons op voor een tussentijdse controle.

De uitslag

Het onderzoek van het weggenomen weefsel duurt doorgaans twee weken. Na twee weken heeft u een telefonische- of controle afspraak op de polikliniek over de uitslag van het weggenomen weefsel. Op deze afspraak wordt de uitslag uitvoerig met u besproken. In de meeste gevallen kan verder met controle-afspraken worden volstaan. Zo niet dan bespreken wij met u wat in uw geval het beste is.

De gevolgen van een conisatie

Omdat slechts een klein stukje van de baarmoedermond wordt weggenomen, is na enige tijd weinig meer te zien en zijn er meestal geen gevolgen. U blijft bijvoorbeeld normaal menstrueren en vruchtbaar.

Heeft u een conisatie ondergaan dan is de kans op een vroeggeboorte tijdens een zwangerschap iets groter dan normaal. Dit is de reden dat de zwangerschapscontroles en de bevalling na een conisatie op medische indicatie in het ziekenhuis plaatsvinden.

Nacontrole op termijn

Na een conisatie blijft u twee jaar bij het Flevoziekenhuis onder controle. Het eerste jaar wordt elk half jaar een uitstrijkje gemaakt, daarna nog één maal aan het einde van het tweede jaar. Om het resultaat op langere termijn te bewaken is het zéér belangrijk dat u voor deze controles op onze polikliniek terugkomt.