

## Sedatie

### Sedatie buiten de OK, informatie na sedatie na bronchoscopie, EBUS en EUS

#### Slaapmedicatie / pijnstilling

Als u een slaapmiddel of pijnstilling (sedatie) heeft gekregen, wordt u de eerste 12 uur ten strengste afgeraden:

- Alcoholische dranken te nuttigen.
- Belangrijke beslissingen te nemen.
- Actief deel te nemen aan het verkeer.
- Gevaarlijke machines te bedienen.

#### Klachten

Na een onderzoek van de long kan uw keel wat geïrriteerd aanvoelen.

Ook kan u wat bloed ophoesten ten gevolge van het onderzoek, dit is normaal. Wanneer u veel bloed (een bodempje van een beker) ophoest, moet u contact opnemen met de huisartsenpost.

Omdat wij het onderzoeksgebied gespoeld hebben met zout water, kan het zijn dat u de hele dag wat zoutig water ophoest. Daardoor kunt zich 's avonds wat griepiger voelen of verhoging krijgen. Als dit boven 38.5 is, moet u contact opnemen met de huisartsenpost.

Omdat wij uw keel en uw longen hebben verdoofd, mag u de eerste 90 minuten niet eten of drinken in verband met de kans op verslikking. Neemt u daarna eerst een klein slokje water om te kijken of de verdoving is uitgewerkt.

#### Direct contact opnemen

Bij toenemende pijn, kortademigheid, koorts met eventuele koude rillingen, bloedverlies moet u tijdens kantoortijden contact opnemen met:

- Tijdens kantoortijden: secretariaat van polikliniek Longziekten ☎ (036) 868 7722.
- Buiten kantoortijden: dienstdoende longarts, via de receptie van het Flevoziekenhuis ☎ (036) 868 8888.
- Bij een acute hulpvraag: Huisartsenpost ☎ (0900) 2030203 of de Spoedpost van het Flevoziekenhuis ☎ (036) 868 8811.