

Sedatie buiten de OK, kinderen

Uw kind maag-, darm-, en lever arts (MDL) heeft voor uw kind een onderzoek met sedatie afgesproken op de kinderafdeling. In deze folder kunt u lezen wat u van de sedatie kunt verwachten en waar u rekening mee dient te houden.

De voorbereiding

- Bij de start van het onderzoek wordt door de arts of een daarvoor speciaal opgeleide verpleegkundige een infuus ingebracht.
- Tevens krijgt uw kind een clipje of pleister aan de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag tijdens het onderzoek te controleren.
- Als het zuurstofgehalte in het bloed van uw kind voor aanvang van het onderzoek goed is, krijgt uw kind door het infuus het medicijn Midazolam (Dormicum®) toegediend. Het doel van dit medicijn is dat uw kind slaperig wordt en minder van het onderzoek merkt. Sommige kinderen kunnen emotioneel reageren als gevolg van de toediening van het medicijn. In tegenstelling tot een echte narcose wordt uw kind niet beademd en kunnen de dokter en verpleegkundige nog met uw kind praten. Vaak vergeet uw kind na het onderzoek wat er tijdens het onderzoek gebeurd is (retrograde amnesie).

De voor en nadelen

Voordeel

- Het grote voordeel is dat uw kind minder van het onderzoek merkt.

Er zijn ook nadelen aan verbonden

- Door het medicijn gaat uw kind oppervlakkiger ademen waardoor het soms nodig is om uw kind extra zuurstof toe te dienen door een slangetje in de neus.
- Uw kind kan overgevoelig zijn voor het gebruikte medicijn.
- Het medicijn zal over het algemeen langer werken dan de duur van het onderzoek. Daarom moet uw kind na het onderzoek nog 1 à 2 uur uitslapen. De verpleegkundige en de arts beslissen samen of uw kind wakker genoeg is om naar huis te gaan.
- Tijdens het uitslapen zal eventueel de bloeddruk gecontroleerd worden. Ook houdt uw kind een clipje of pleister aan de vinger om het zuurstofgehalte en de hartslag te controleren.
- Bij vertrek uit het ziekenhuis mag uw kind de eerste 12 uur niet werken of naar school, niet zwemmen of sporten en niet deelnemen aan het verkeer. Bij een ouder kind is van belang dat er de eerste 12 uur geen alcohol gebruikt mag worden.
- Uw kind kan die dag vergeetachtig zijn.
- In speciale gevallen (als hart, nieren of longen op het moment van het onderzoek heel slecht werken) kan de kinder MDL-arts op dat moment ervan af zien het medicijn te geven vanwege de kans op complicaties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de maag-, darm-, en lever (MDL) verpleegkundige Kindergeneeskunde, ☎ (036) 868 9517.