

Sedatie buiten de OK, informatie na sedatie

Slaapmedicatie / pijnstilling

Indien u een slaapmiddel / pijnstilling ('sedatie') heeft gekregen, wordt u de eerste 12 uur ten strengste afgeraden:

- Alcoholische dranken te nuttigen.
- Belangrijke beslissingen te nemen.
- Actief deel te nemen aan het verkeer.
- Gevaarlijke machines te bedienen.

Klachten

Na een onderzoek van de maag kan uw keel wat geïrriteerd aanvoelen. U kunt dan het beste gorgelen met wat lauwwarm, zout water. U kunt ook keelpastilles nemen.

Na een onderzoek van de darmen is een vol gevoel of buikkrimp heel normaal. Dit kan komen door de achtergebleven lucht in de darmen. Beweging helpt u om de overtollige lucht weer kwijt te raken.

In het algemeen geldt

Bij toenemende pijn, misselijkheid, braken, kortademigheid, koorts met eventuele koude rillingen, bloedverlies oraal of via de anus of een blijvend opgezette buik, moet u contact opnemen met:

Tijdens kantooruren:

Het secretariaat van polikliniek Maag-, Darm, en Leverziekten (MDL), ☎ (036) 868 8616.

Buiten kantooruren:

De dienstdoende arts-assistent van MDL, via de Receptie van het Flevoziekenhuis, ☎ (036) 868 8888.

Bij acute hulpvraag:

De Spoedpost van het Flevoziekenhuis, ☎ (036) 868 8811.