

IBD en beclometason

Behandeling ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

Bij patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn veranderingen in de werking van het immuunsysteem vastgesteld. De exacte oorzaak is niet bekend. Vast staat dat de klachten worden veroorzaakt door uit de hand gelopen afweerreacties die ontstekingen in de darmwand veroorzaken. Er wordt onder meer verondersteld dat het afweersysteem overactief is en reageert op bacteriën die zich (altijd) in de darm bevinden. Dit heet een auto-immuun ziekte; een ziekte waarbij het afweersysteem lichaamsweefsels niet herkent als lichaamseigen en ze probeert stuk te maken. De behandeling richt zich dan ook meestal op het onderdrukken van het immuunsysteem.

Hoe werkt beclometason?

Uw arts heeft u beclometason voorgeschreven. Beclometason is een corticosteroid. Een corticosteroid is een hormoon dat ook door uw bijnier wordt geproduceerd, het werkt (onder andere) lokaal ontstekingsremmend.

Wanneer geen beclometason?

In verband met het ontstekingsremmende effect wordt gebruik afgeraden als u een bacteriële of virale infectie hebt.

Wijze van toediening

Beclometason wordt oraal of via klysma's (rectaal) toegediend. Klysma's zijn kleine slangen welke het medicijn bevatten en via de anus in de darm worden opgeschoven. Klysma's worden elke avond in liggende houding (linker zijde) toegediend.

Start effect medicatie

Beclometason werkt over het algemeen na 2-4 weken.

Bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van beclomethason die ooit zijn voorgekomen. Dit kan een vertekend beeld geven.

Bijwerkingen die soms voor komen zijn maag-darmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, of stemmingsveranderingen. Bij rectale toediening (klysma's) kan rectale jeuk of irritatie optreden.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er is geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is veilig.

Vragen?

Vanzelfsprekend kunt u met eventuele andere vragen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag-, Darm- en Lever (MDL), ☎ (036) 868 8616.