

## Staken van Clopidogrel (of andere trombocytenuitstapremmers)

Vaak is staken van Clopidogrel bij tandheelkundige ingrepen **NIET** nodig (bron: ACTA protocol).

- Dit is een medicijn dat u de levenslang moet blijven slikken tenzij uw arts iets anders heeft gezegd.
- Als pijnstiller, bijvoorbeeld als u hoofdpijn heeft, adviseren wij u alleen paracetamol te gebruiken.
- Patiënten van boven de 70 jaar oud of patiënten met een maagbloeding of maagklachten worden geadviseerd een maagbeschermer te slikken naast dit medicijn (Pantaprazol).

## Staken van Clopidogrel (of andere trombocytenuitstapremmers)

Vaak is staken van Clopidogrel bij tandheelkundige ingrepen **NIET** nodig (bron: ACTA protocol).

- Dit is een medicijn dat u de levenslang moet blijven slikken tenzij uw arts iets anders heeft gezegd.
- Als pijnstiller, bijvoorbeeld als u hoofdpijn heeft, adviseren wij u alleen paracetamol te gebruiken.
- Patiënten van boven de 70 jaar oud of patiënten met een maagbloeding of maagklachten worden geadviseerd een maagbeschermer te slikken naast dit medicijn (Pantaprazol).