

U heeft zojuist een corticosteroid-injectie gehad

Wat is een corticosteroid-injectie?

Een corticosteroid-injectie is een injectie met een combinatie van het hormoon corticosteroid en een verdovend medicijn (zoals Bupivacaïne).

Door het verdovend medicijn kunnen uw pijnklachten al direct verminderen. Deze medicijnen zijn vaak na ongeveer 24 uur uitgewerkt.

Het corticosteroid begint gemiddeld na drie tot vier dagen te werken. Of u baat heeft bij de behandeling met een corticosteroid-injectie is na twee weken optimaal te beoordelen.

Wat zijn corticosteroiden?

Corticosteroiden zijn hormonen die door de bijnier worden gemaakt. Corticosteroiden werken ontstekingsremmend. Dit is niet hetzelfde als antibiotica, die tegen bacteriën werken.

De ontsteking waar corticosteroiden tegen werken komt vanuit het lichaam zelf, zoals bijvoorbeeld bij een bursitis (slijmbeursontsteking), een tendosynovitis (peesschedeontsteking), osteoartritis (gewrichtsslijtage) of een systeemziekte.

De corticosteroid-injectie die u krijgt, bevat synthetische (nagemaakte) corticosteroiden met dezelfde werking als het hormoon dat door de bijnier wordt gemaakt. Daarom zijn er bijwerkingen op allerlei processen in het lichaam zoals de hoeveelheid bloedsuiker, de eiwit- en vetstofwisseling en de water- en zouthuishouding.

Mogelijke bijwerkingen

De kans op bijwerkingen is niet groot, maar het kan zijn dat:

- de plaats van de injectie nog enkele dagen gevoelig is.
- u tijdelijk een gevoel zoals bij “menopause-opvliegers” krijgt.
- de huid rond de plaats van de injectie wat verkleurt en/of plaatselijk wat dunner wordt.
- u tijdelijk een warmer en roder gelaat ervaart.
- u tijdelijk spierpijn en/of een grieperig gevoel heeft.
- als u diabetes (suikerziekte) heeft, u tijdelijk last kan hebben van een onregelde bloedsuikerspiegel. Meet uw bloedsuiker daarom frequent.