

Behandeling van extravasatie van toegediend contrastmiddel

U heeft een onderzoek gehad waarbij het voor een goede beoordeling door de radioloog gewenst was om contrastmiddel toe te dienen.

Het contrastmiddel is u toegediend via het infuus in de ader. Het contrastmiddel is (deels) buiten het bloedvat terecht gekomen. Dit heet extravasatie. In de meeste gevallen geeft dit weinig tot geen hinder.

Wat is contrast?

Contrastmiddel vertelt de radioloog iets over de eigenschappen van de weefsels waarnaar gekeken wordt. Ondanks het gebruik van het veiligste röntgencontrastmiddel (niet ionisch) kan extravasatie toch beperkte klachten geven.

Wat is extravasatie?

Extravasatie betekent dat er röntgencontrast buiten het bloedvat terecht is gekomen. Wellicht heeft u tijdens het onderzoek pijn ervaren. Dit komt omdat er een zwelling is opgetreden die druk veroorzaakt op de omliggende weefsels. De huid kan in het begin zowel een rode en/of bleke verkleuring geven, een brandend gevoel of jeuk kan optreden. Soms zijn er geen klachten.

Wat moet er nu gebeuren?

De behandeling is al in de onderzoekskamer gestart. Er is geen concrete therapie die de klachten verhelpt. Wel wordt het vaak als prettig ervaren om de plek te koelen en zo mogelijk omhoog te leggen. Blijf uw arm ook bewegen, dit ondersteunt de afvoer van het extravasaat.

Wat moet ik doen als de klachten erger worden?

Wij raden u aan bij toename van pijn, roodheid, tintelingen of een doof gevoel telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedpost: ☎ (036) 868 8811.