

Frenulotomie

Operatief doorsnijden van het toompje van de voorhuid

Voor de ingreep

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Er is geen speciale voorbereiding nodig. U mag dus gewoon eten en drinken. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten. Bloedverdunnende middelen moet u in overleg met de arts eventueel stoppen.

De ingreep

Voor de ingreep wordt de huid van de penis gedesinfecteerd. De arts geeft enkele injecties met een verdovend middel in en rondom het toompje en de omgeving wordt met een steriele doek afgedekt. De ingreep is een dwarse doorsnijding van het toompje. Dit geeft een verlengend effect. Soms wordt het wondje daarna in de lengterichting met oplosbaar hechtmateriaal gesloten. De wond wordt niet verbonden. Eventueel kan er vaseline of een gel op het wondje worden gedaan. De eroverheen geschoven voorhuid geeft voldoende bescherming.

Na de ingreep

U kunt na de operatie beter niet zelf deelnemen aan het verkeer. U kunt het beste uw vervoer terug naar huis regelen voordat u naar het ziekenhuis gaat.

U kunt een wat pijnlijk en branderig gevoel hebben ter plaatse van de ingreep. Als pijnstiller kan eventueel paracetamol gebruikt worden. De wond geneest meestal snel, maar is nog enige tijd gevoelig en kwetsbaar. Seksuele activiteit wordt daarom de eerste twee weken na de ingreep ontraden.

Het komt wel eens voor dat er een kleine nabloeding optreedt. In dat geval kunt u een verbandje om uw penis doen en dat gedurende een kwartier met de hand aandrukken. Erecties kunnen kort na de ingreep gevoelig zijn, maar kunnen geen kwaad voor de wond.

Tot slot

Bij vragen of eventuele problemen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie, ☎ (036) 868 8718.

Buiten kantooruren kunt u bij complicaties contact opnemen met de Spoedpost, ☎ (036) 868 8811.