

Oxazepam

Oxazepam vermindert angstgevoelens en verschijnselen die daarmee gepaard kunnen gaan zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren.

U krijgt dit middel nu om angstgevoelens en paniek (claustrofobie) te dempen die op kunnen treden tijdens het MRI onderzoek. Het effect begint binnen één tot twee uur na inname en houdt zes tot tien uur aan. U dient de voorgeschreven dosering (10 tot 50 mg) daarom **2 uur vóór het MRI onderzoek** in te nemen.

De belangrijkste bijwerkingen zijn sufheid. U mag deze dag daarom **geen** voertuig besturen. NB: ook niet alleen komen maar onder begeleiding.

Mogelijke bijwerkingen

Onderstaande bijwerkingen zijn zeldzaam en treden bij eenmalig gebruik in de regel niet op:

- **Verminderde coördinatie.** Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
- **Spierzwakte**, krachteloos gevoel in spieren.
- **Maagdarmstoornissen**, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
- **Hoofdpijn en duizeligheid.** Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
- **Zweten en hartkloppingen.**
- **Droge ogen.** Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
- **Huiduitslag en jeuk.** Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw neuroloog als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
- **Afhankelijkheid.** U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein.

Tot slot

Mocht u nog vragen over deze folder hebben, stel deze aan uw behandelaar of bel naar polikliniek Neurologie, ☎ (036) 868 87 20.