

Metoclopramide bij misselijkheid door chemotherapie

Bij chemotherapie is misselijkheid een veelvoorkomende bijwerking. Er bestaat een aantal medicijnen om deze bijwerking te behandelen en voorkomen. Metoclopramide is een van deze middelen. Sinds enige tijd is bekend dat metoclopramide in zeldzame gevallen, vaak bij langdurig gebruik in hoge dosering, kan leiden tot tardieve dyskinesie.

Er is om deze reden een waarschuwing van het Europees Geneesmiddelenbureau uitgevaardigd tegen het gebruik van metoclopramide langer dan 5 dagen of meer dan driemaal daags 10 milligram.

Wat is tardieve dyskinesie?

Bij tardieve dyskinesie ontstaan er niet te beheersen bewegingen. Dit kunnen bijvoorbeeld tics zijn, of het meer dan normaal knippen met de ogen, of bewegingen van tong, mond, handen, voeten, armen, benen, of nek. Ook het maken van vreemde geluiden is een mogelijkheid. Dit kan optreden na het gebruik van medicijnen zoals metoclopramide. Vaak is dit na vele maanden gebruik van het medicijn, en in hoge doseringen. Meestal gaat het over, maar ook dan kan het maanden aanhouden.

Uw behandelaar heeft voorgesteld metoclopramide langduriger te gebruiken dan 5 dagen of in een hogere dosering dan geadviseerd. Dit heeft hij/zij gedaan vanwege uw klachten van misselijkheid ondanks medicijnen in de gebruikelijke doseringen. Tardieve dyskinesie als gevolg van metoclopramide is zéér zeldzaam.

Nota bene, tardieve dyskinesie is niet de enige potentiële bijwerking van metoclopramide. Meestal leidt het gebruik van metoclopramide niet tot bijwerkingen. Slaperigheid, diarree, het uitblijven van menstruaties, verwardheid, impotentie, en spontane melkproductie door of spontane groei van de borstklieren zijn andere voorbeelden.

Ook kan metoclopramide tot andere motorische klachten dan tardieve dyskinesie leiden. Motorische klachten bij het gebruik van metoclopramide worden slechts in een klein deel van de gevallen door tardieve dyskinesie veroorzaakt.

Toestemming

We vragen u om een handtekening te zetten waarmee u toestemming geeft voor het gebruik van metoclopramide ondanks de officiële waarschuwing.

Bij vragen kunt u zich uiteraard tot uw behandelaar wenden.

Naam en geboortedatum: _____, ____ - ____ - _____

Plaats, datum: _____

.....