

## Nazorg oorschelpcorrectie (Plastische chirurgie)

- Hoofdverband 5 dagen blijven dragen. Indien eerder los, overstappen op de haarband.
- Zelf afdoen en daarna gedurende 3 weken stevige haarband alleen 's avonds en 's nachts dragen.
- Oren zijn na het verwijderen van het drukverband vaak gezwollen, rood/blauw verkleurd. De oren zijn wat gevoelig.
- Het gevoel in de oorschelp is minder gedurende de eerste weken, dit is normaal.
- Bij pijn: paracetamol dosering volgens onderstaande tabel.
- Haren wassen: na verwijderen hoofdverband.
- Sporten (dus ook zwemmen) etc. pas na 6 weken in verband met genezing van het kraakbeen.
- School: mag met hoofdverband.
- Bij problemen binnen 24 uur kunt u telefonisch contact opnemen met de Spoedpost, ☎ (036) 868 8811.
- U krijgt een controle afspraak mee naar huis.
- Bij problemen voor de controle afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, ☎ (036) 868 8843.

Zetpillen of tabletten			Zetpillen of tabletten		
Gewicht in Kg	Paracetamol	Dosering per dag	Gewicht in Kg	Paracetamol	Dosering per dag
5 – 7,5	120 mg	3	50 – 75	1000 mg	3
7,5 – 10	240 mg	3	> 75	1000 mg	3
10 – 15	300 mg	3			
15 – 20	360 mg	3			
20 – 30	500 mg	3			
30 – 40	740 mg	3			
40 - 50	1000 mg	3			

