

Hysterosalpingografie (HSG)

De gynaecoloog heeft u voorgesteld om een hsg (= hysterosalpingogram of baarmoederfoto) te laten maken.

Bij een HSG onderzoek worden baarmoeder en eileiders met behulp van contrast middel in beeld gebracht.

Uw afspraak

U wordt verwacht voor het onderzoek op:

Dag: _____ Datum : _____ Tijd: _____

In de centrale hal kunt u een nummer trekken voor de afdeling Radiologie.

Vervolgens kunt u plaats nemen bij de banken. Vanaf hier kunt u op de schermen aan de muur zien wanneer uw nummer aan de beurt is en bij welke balie u zich kunt melden. De baliemedewerkster meldt u aan voor het onderzoek en verwijst u naar de juiste ontvangstruimte.

Als u niet bent ingeschreven bij het Flevoziekenhuis, vragen wij u zich wat eerder dan de afgesproken tijd te melden.

Het is verplicht om u te legitimeren. Houd uw geldige legitimatiebewijs bij de hand.

Wij verzoeken u om 15 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn. Indien u te laat komt, loopt u het risico dat het onderzoek niet door kan gaan en u een nieuwe afspraak moet maken.

Verhinderig

Als u een gemaakte afspraak niet na kunt komen, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie, ☎ (036) 868 8743. Op uw afspraaktijd kunnen wij dan een andere patiënt onderzoeken.

Vorbereiding

Het onderzoek moet plaatsvinden tussen cyclusdag 5 en cyclusdag 12 zodat u zeker weet dat u niet zwanger bent! Wanneer u twijfelt, moet u eerst een zwangerschapstest doen!

Het is aan te raden om van te voren (ongeveer 1½ uur) een pijnstillertje in te nemen, welke u altijd al gebruikt tegen hevige menstruatiekrampen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie. De gynaecoloog brengt een eendenbek (speculum) in de vagina. Door de opening van het speculum wordt een katheter in de baarmoeder gebracht.

Aan de katheter zit een ballonnetje, dit wordt opgeblazen ter hoogte van de ingang van de baarmoeder. Het opblazen van het ballonnetje kan een menstruatieachtige pijn veroorzaken. De baarmoedermond is zo afgesloten, anders zou de contrastvloeistof die ingebracht wordt, kunnen weglopen.

De gynaecoloog spuit contrastvloeistof door de katheter de baarmoeder in. De contrastvloeistof kan zich dan naar de eileiders verspreiden. Zo kan men zien of de eileiders doorgankelijk zijn.

Tijdens het inbrengen van de contrastvloeistof kijkt de radioloog op het röntgentoestel mee en maakt röntgenfoto's.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek neemt circa 20 minuten in beslag.

Na het onderzoek

Na het onderzoek zou het kunnen zijn dat u wat bloed verliest en wat contrastvloeistof. U krijgt een maandverbandje mee.

De uitslag

De uitslag wordt met u besproken bij uw behandelend arts.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie, ☎ (036) 868 87 43 (8.30 – 16.30 uur).