

Therapeutische wortelblokkade bij Radiologie

U heeft een afspraak voor een therapeutische wortelblokkade. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Flevoziekenhuis. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling.

Therapeutische wortelblokkade

Bij een wortelblokkade wordt een zenuw(tak) behandeld met pijnstilling en een ontstekingsremmer. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te 'blokkeren') en de zenuw tot rust te brengen.

Belangrijk ter voorbereiding

Neem een begeleider mee in verband met verminderd gevoel in het been, u kunt niet zelfstandig naar huis.

Bij het gebruik van bloedverdunners dient de patiënt te overleggen met de aanvragend specialist.

Belangrijk voor u om vooraf te melden:

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Radiologie als één van de onderstaande zaken op u van toepassing zijn. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

- Gebruik van bloedverdunnende medicijnen.
- Een (mogelijke) zwangerschap (de behandeling is onder röntgendoorlichting. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind).
- Suikerziekte.
- Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De behandeling

Ontvangst

- U meldt zich bij de receptie van afdeling Radiologie in het Flevoziekenhuis. Zorg a.u.b. dat u 15 min voor de afspraaktijd aanwezig bent, in verband met het voorafgaande intakegesprek.
- U wordt verwezen naar de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant van de afdeling Radiologie u op en brengt u naar de behandelkamer.
- In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

De behandeling

- U komt op uw buik op een tafel te liggen.
- De aangedane zijde wordt gemarkeerd met een pijl.
- De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol op de plaats waar u de wortelblokkade krijgt.

- Onder röntgendoorlichting plaatst de radioloog een naaldje. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens dient de radioloog een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel toe in naast de zenuwwortel.
- De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties / bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een wortelblokkade optreden:

- Tijdelijke krachtsvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt en kan de punctieplek tijdelijk gevoelig zijn.
- Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.
- De eerste week na de behandeling kunnen de klachten tijdelijk toenemen. Hierna zal de pijn afnemen.

Naar huis

- Na de behandeling mag u deze dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.
- Op de punctieplek wordt een pleister geplakt. Deze mag u na een ½ uur verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Radiologie, bereikbaar op alle werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur:

☎ **(036) 868 8543.**