

# Nazorg niet ingedaalde testis

## Leefregels en adviezen

- **Wondje:** De pleister mag de volgende dag verwijderd worden. Na enige tijd lossen de hechtingen vanzelf op.  
Bij een **nabloeding** binnen 24 uur kunt u contact opnemen met de Spoedpost ☎ (036) 868 8811.
- **Pijn:** Paracetamol dosering volgens onderstaande tabel.
- **Douchen:** De volgende dag mag uw kind weer douchen.
- **Baden:** Na een week mag uw kind weer in bad.
- **School:** Uw kind de eerste week thuis houden. Hij heeft rust nodig. De tweede week kan uw kind eventueel weer naar school.
- **Kleding:** De eerste week kunt u uw kind zachte wijde broeken laten dragen, bijvoorbeeld een trainingsbroek.
- **Zwemmen:** Uw kind mag de eerste twee weken **niet** zwemmen.
- **Sporten/fietsen:** De eerste twee weken mag uw kind niet sporten of fietsen.
- **Controle:** U krijgt een afspraak mee voor nacontrole op de polikliniek.
  - Polikliniek Urologie: ☎ (036) 868 8718.
  - Polikliniek Chirurgie: ☎ (036) 868 8701.

| Zetpillen of tabletten |             |                  | Zetpillen of tabletten |             |                  |
|------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|
| Gewicht in Kg          | Paracetamol | Dosering per dag | Gewicht in Kg          | Paracetamol | Dosering per dag |
| 5 – 7,5                | 120 mg      | 3                | 50 – 75                | 1000 mg     | 3                |
| 7,5 – 10               | 240 mg      | 3                | > 75                   | 1000 mg     | 3                |
| 10 – 15                | 300 mg      | 3                |                        |             |                  |
| 15 – 20                | 360 mg      | 3                |                        |             |                  |
| 20 – 30                | 500 mg      | 3                |                        |             |                  |
| 30 – 40                | 740 mg      | 3                |                        |             |                  |
| 40 - 50                | 1000 mg     | 3                |                        |             |                  |

